



Jarosław Litwin
Radny Rady Miejskiej w Łęborku
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Łębork



Łębork, 24 października 2023r.

DO: Witold Namyślak
Burmistrz Miasta Łęborka



ZAPYTANIE

W związku z udostępnioną przez Urząd Miejski informacją dotyczącą stosowania herbicydu Roundup do zwalczania inwazyjnego gatunku rośliny rdestowca japońskiego w Łęborku, proszę o informacje dlaczego w tym przypadku nie zastosowano wytycznych przygotowanych przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na zlecenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska („Wytyczne dotyczące zwalczania rdestowców na terenie Polski”, Katowice, 2015)? Cytat z publikacji (strony 98, 99):

Obecnie stosowanie preparatu Roundup, ze względu na jego dużą toksyczność, jest ograniczone lub zabronione na obszarach znajdujących się blisko rzek, strumieni czy rowów, szczególnie w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody lub pól uprawnych (Nielsen i in. 2007; Wojtkowiak i in. 2008), także na terenach parków narodowych i rezerwatów oraz w ich otulinach. Podejrzewa się, że wywołuje on niepożądane skutki uboczne, powodując deformacje embrionów zwierzęcych (m.in. ryb, płazów), a także stwarzając zagrożenie dla zdrowia człowieka (wykazano m.in. związek między stosowaniem glifosatu a zachorowalnością ludzi na raka – Kwiatkowska i in. 2013).

Badania prowadzone w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym dowodzą, że takie działania są nieskuteczne. Pomimo początkowych sukcesów, gdy skuteczność niszczenia roślin w okresie od 2 do 8 tygodni po oprysku dochodzi do ok. 75%, po upływie 3 miesięcy następuje ich odrastanie z części podziemnych. Po upływie 5 miesięcy od wykonania zabiegu herbicydowego obserwowano odrastanie 93% roślin, czyli osiągnięto zbliżony stan jak przed wykonaniem oprysku. Ujemną stroną stosowania środków zawierających glifosat jest również brak selektywności w stosunku do innych gatunków roślin występujących na opryskiwanym obszarze. Oznacza to, że przy okazji zwalczania rdestowców niepotrzebnie niszczone są również inne gatunki. W ramach wykonanych doświadczeń (szczegóły poniżej) przebadano kilkanaście możliwych wariantów chemicznego zwalczania dwóch gatunków rdestowców (ostrokończystego i sachalińskiego). Na podstawie tych badań można stwierdzić, że chemiczna walka z rdestowcami nie jest prosta. Wynika to z tego, że są one mało wrażliwe na większość stosowanych herbicydów i po pewnym czasie rośliny odrastają.

Czy Urząd Miejski lub wykonujące prace w przestrzeni miejskiej na jego zlecenie podmioty stosują herbicyd Roundup także w innych przypadkach? Jeśli tak, to w jakich miejscach, kiedy i dlaczego był stosowany?

W związku ze stosowaniem środka Roundup, który jest szkodliwy dla ludzi i zwierząt – czy osoby wykonujące opryski w odpowiedni sposób ostrzegają wcześniej o planowanym zabiegu mieszkańców i osoby korzystające z pobliskiej przestrzeni oraz czy miejsce takie jest odpowiednio oznaczone po przeprowadzeniu zabiegów?

Czy prawdą jest, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w publikowanych zaleceniach wskazuje, aby środków z grupy ROUNDUP nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej? Czy Urząd Miejski posiada informacje w tej sprawie?

Poruszone wyżej kwestie w istotny sposób wpływają na zdrowie i życie mieszkańców, dlatego proszę o wyczerpującą odpowiedź w jak najkrótszym terminie.

Z poważaniem,
Jarosław Litwin